

Candin[®]et

uniderm

Candin[®]et

ACT2%

Schiuma Detergente Attiva ultra delicata.

INDICAZIONI

- Infezioni e irritazioni vaginali (vagini batteriche, vulvovaginiti, micosi).
- Nella profilassi pre-operatoria (preparazione cutaneo/mucosa pre-intervento).
- Nel trattamento di Balaniti e Balanopostiti.
- Post episiotomia.
- Candidosi anale.
- Micosi cutanee.
- Detersione zona genitale neonati in presenza di irritazione.

ISTRUZIONI D'USO E POSOLOGIA

Utilizzare Candin[®]et Act 2% mattina e sera o più volte al giorno secondo necessità. Applicare sulle mucose genitali esterne e l'area perianale. Lasciare agire per qualche istante. Sciacquare con acqua.



Candin[®]et

OVULI

Azione acidificante e riequilibrante dell'ecosistema vaginale.

INDICAZIONI

- Profilassi vaginiti e vaginosi.
- Esiti incerti pap test (es. lieve flogosi).
- Coadiuvante in corso di terapie con antibiotici sistemici.
- Prevenzione PROM e travaglio pretermine.

ISTRUZIONI D'USO E POSOLOGIA

1 ovulo die la sera prima di coricarsi per 6 giorni.

PROFILASSI a seguito della terapia farmacologica: 1 ovulo ogni 3 giorni la sera prima di coricarsi per 3 applicazioni per 4 mesi di trattamento.



Candin[®]et

LAVANDA

Lavanda detergente vaginale.

INDICAZIONI

- Rimozione meccanica carica batterica in caso di infezioni vaginali.
- Detersione interna con effetto veicolante prima dell'applicazione dei topici vaginali trattanti.
- "Lavaggio" vaginale in sostituzione pessario.

ISTRUZIONI D'USO E POSOLOGIA

Utilizzare la lavanda monouso vaginale prima dell'utilizzo di terapia topica o prima dell'applicazione di dispositivi medici intravaginali.

